

ОБРАЗЕЦ ПРОТОКОЛА И АНАЛИТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА МЕТААНАЛИЗА ПО СТАНДАРТУ PRISMA 2020

Оформление по ГОСТ 7.32-2017 и ГОСТ Р 7.0.11-2011 (Times New Roman, 12–14 pt, 1.5 интервал,
абзацный отступ 1,25 см)

1. Методологический протокол синтеза данных (критерии PICOS)

Настоящий фрагмент иллюстрирует процедуру количественного синтеза клинических и экспериментальных данных в рамках научно-исследовательской работы. В соответствии с рекомендациями PRISMA 2020 отбор публикаций осуществлялся по критериям PICOS: популяция (Patients) — взрослые пациенты с верифицированным диагнозом [2, с. 48]; вмешательство (Intervention) — таргетная терапия первой линии; группа сравнения (Comparator) — стандартный терапевтический протокол; исходы (Outcomes) — частота достижения первичной клинической ремиссии через 24 недели наблюдения; дизайн исследований (Study design) — рандомизированные контролируемые испытания (РКИ). Поисковая стратегия реализована в международных реферативных базах данных PubMed, Scopus, Web of Science и Научной электронной библиотеке eLibrary.ru за период 2018–2024 гг.

2. Сводная таблица включенных первичных исследований и расчета эффектов

Исследование (автор, год)	Выборка (N1 / N2)	Отношение шансов (OR)	95% Доверительный интервал (ДИ)	Вес в модели (w _i , %)
Смирнов В.А. и др., 2020 [4]	124 / 120	1.64	1.08 – 2.49	18.4 %
Harrison R. et al., 2021 [7]	210 / 205	1.82	1.25 – 2.65	24.6 %
Кузнецова Е.И., 2022 [9]	95 / 98	1.45	0.89 – 2.36	14.1 %
Müller K. et al., 2023 [11]	310 / 305	1.91	1.38 – 2.64	28.2 %
Васильев П.Н. и др., 2024 [14]	110 / 112	1.58	0.98 – 2.55	14.7 %
Итоговая оценка (Pooled Effect)	849 / 840	1.73	1.41 – 2.12	100.0 %

3. Статистическая интерпретация и оценка гетерогенности

Анализ гетерогенности включенных наблюдений по критерию Кокрана ($Q = 3.82$, $df = 4$, $p = 0.431$) и индексу гетерогенности Хиггинса ($I^2 = 0.0$ %) свидетельствует об отсутствии статистически значимой вариабельности между результатами независимых испытаний, что обуславливает применение модели с фиксированными эффектами (Fixed Effect Model). Суммарное отношение шансов $OR = 1.73$ (95% ДИ: 1.41–2.12; $Z = 5.21$, $p < 0.0001$) демонстрирует статистически достоверное преимущество таргетного протокола

над стандартной схемой терапии. Проверка асимметрии воронкообразного графика (Funnel Plot) методом линейной регрессии Эггера (intercept = 0.48, $p = 0.62$) не выявила признаков публикационного смещения (Publication Bias), подтверждая надежность полученных выводов [11, с. 142].