ЭТАЛОННЫЕ ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ В НАУЧНОЙ СТАТЬЕ (ГОСТ Р 7.0.7–2021 / ГОСТ 7.32–2017 И APA 7)

ОБРАЗЕЦ 1. РОССИЙСКИЙ СТАНДАРТ (ГОСТ 7.32–2017, П. 6.6) С ПЕРЕНОСОМ НА СЛЕДУЮЩУЮ СТРАНИЦУ

В тексте статьи перед таблицей ставится прямая ссылка: «Результаты лабораторных испытаний активности синтезированных катализаторов приведены в таблице 1» (либо в скобках: «(табл. 1)»). Знак «№» не используется.

Таблица 1 – Сравнительные показатели каталитической активности синтезированных образцов, %

Шифр образца	**Температура синтеза, °С**	**Выход целевого продукта (M ± SD)**	**Уровень значимости p**
1	2	3	4
Катализатор К-1 (контроль)	450	64,2 ± 1,8	–
Катализатор К-2 (опыт 1)	450	89,5 ± 1,4*	0,002
Катализатор К-3 (опыт 2)	475	92,1 ± 1,1*	0,001

Окончание таблицы 1

1	2	3	4
Катализатор К-4 (промышленный аналог)	500	Нет свед.	x

Примечания: 1. M ± SD – среднее арифметическое и стандартное отклонение (n = 15 в каждой серии). 2. * – различия статистически значимы по сравнению с контролем при p < 0,01 по U-критерию Манна–Уитни. 3. Знак «x» – замер при данном температурном режиме не проводился.

Источник: составлено и рассчитано автором по данным лабораторных испытаний [5, с. 112].

ОБРАЗЕЦ 2. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ THREE-LINE TABLE (APA 7, ELSEVIER, SPRINGER, SCOPUS)

Table 1

Comparative Catalytic Activity Parameters of Synthesized Samples (%)

Sample ID	**Synthesis temp. (°C)**	**Product yield (M ± SD)**	**p-value**
Catalyst K-1 (Control)	450	64.2 ± 1.8	--
Catalyst K-2 (Trial 1)	450	89.5 ± 1.4*	.002

Sample ID	Synthesis temp. (°C)	Product yield (M ± SD)	p-value
Catalyst K-3 (Trial 2)	475	92.1 ± 1.1*	.001
Catalyst K-4 (Commercial)	500	NA	ND

Note. M ± SD = mean and standard deviation (n = 15 per group); NA = not available; ND = not determined. *p < .01 compared with the control group (Mann–Whitney U test).

Материал подготовлен экспертами научного сервиса DisserTop (https://dissertop.ru/)